

PRESENTATION

- Bouteille 1L
- Bidon 5L
- Bidon 25 L

COMPOSITION

- Acides aminés : 20,5% p/p
- Mono, di, tri polysaccharides : 15% p/p
- Oligo-éléments chélatés (Fe, B) :1%p/p
- Potassium(K₂O) : 8.5%p/p

MODES ET DOSES D'EMPLOI

CULTURES	DOSES ET APPLICATION
Arbres fruitiers (raisin de table et de cuve, poirier, pommier, pécher, nectarine, abricotier, cerisier, agrumes)	300 à 350 ml/hl Premier traitement 30 jours avant la récolte, deuxième application 15 jours avant récolte.
Légumes de plein champ (tomate, melon, pastique, fraisier)	3 à 3.5 L/ha 2 applications 30 puis 15 jours avant la récolte
Cultures sous serre	200 à 250ml/ha Deux traitements à partir du grossissement des fruits

BRIXER doit être employé en pulvérisation foliaire sur toutes les cultures.

BRIXER

PROMOTEUR NATUREL DE MATURITE

DESCRIPTION

Brixer a étudié pour intensifier et uniformiser la maturité des fruits, réduire le nombre de fruits verts au moment de la récolte et diminuer ainsi le nombre de passages de cueillette.

Brixer contient des substances naturelles (méthionine, polysaccharides, extraits d'algues brunes et de yucca) qui accélèrent la maturité des fruits, anticipent la coloration et accélèrent l'accumulation des sucres. Appliqué en foliaire

Brixer améliore d'une manière substantielle la qualité des fruits.

AVANTAGE

- Uniformisation de la maturité des fruits
- Accélérateur du procédé de maturation
- Anticipe la coloration et l'accumulation des sucres

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC
Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

